

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA WYSTĘPOWANIA OGNISK AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Istotne informacje związane z zagrożeniem ASF dla hodowcy dotyczą:

- zakazu kupowania świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego,
- zakazu skarmiania zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym reszkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego,
- unikania kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą swinia lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie,
- zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
- zakazu utrzymywania świń w budynkach, w których są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne,
- zabezpieczenia budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni),
- rezygnacji z udziału w polowaniach,
- zachowania podstawowych zasad higieny,
- stosowania odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
- zastosowania mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich,
- uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków inwentarskich.

Osoba, która znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Istotne informacje związane z zagrożeniem ASF w lesie:

- nie wolno pozostawiać w lesie żadnych odpadków żywnościowych,
- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas),
- nie należy spuszczać psów ze smyczy,
- w przypadku znalezienia truchła lub nawet szczątków dzika, oznakować miejsce, nie dotykać szczątków zwierzęcia i powiadomić lokalne władze.

Osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania.